

Recensement des oiseaux de Noël (RON) 2004

Le 105^{em} Recensement des oiseaux de Noël (RON) s'est déroulé le 18 décembre 2004, sur toute la Gaspésie, avec une température variant entre – 8 et – 18°C. Le temps était clair à partiellement clair et aucune pluie ou neige tombait sur le territoire, en cette journée. 45 observateurs ont totalisé 138.50 heures d'observation sur le terrain. Un nombre total de 69 espèces pour 9,859 individus. Un gros aux gens qui ont fait le décompte aux mangeoires. Leurs observations sont incluses dans les résumés.

Pour Forillon : Un total de 45 espèces + 2 sp dans la semaine du RON pour un total de 2,925 individus observés. 4 espèces furent notées, pour la première fois, lors des 3 derniers RONs sur le territoire, le **Grèbe jougris**, le **Cormoran à aigrettes**, le **Pic à ventre roux** et le **Gros-bec errant**. Les 3 espèces observées en plus grand nombre depuis 3 ans sont la **Bernache du Canada**, la **Mésange à tête noire**, le **Jaseur Boréal**. Le plus bas nombre d'individus chez le **Sizerin flammé**.

Pour Percé : 11 observateurs sur le terrain totalisant 45.50 heures. 59 espèces ont permis d'observer 3,163 individus. Sont notés une première fois lors d'un RON depuis 3 ans, le **Cormoran à aigrettes**, l'**Autour des palombes**, le **Pic à ventre roux** et le **Quiscale rouilleux**. Un plus haut taux noté pour la **Sittelle à poitrine rousse**, le **Jaseur boréal** et le **Durbec des sapins**. Finalement, le **Sizerin flammé** est aussi en nombre moindre en cette journée.

Pour New-Richmond : 5 participants ont dénombré 35 espèces d'oiseaux. Un total de 1,802 individus durant les 12.75 heures à tenter de découvrir le plus d'oiseaux possible lors de ce RON. Le **Pic à ventre roux** est aussi noté pour une première fois dans ce secteur depuis des 3 dernières années. Le **Goéland marin** était en grand nombre tandis que le **Sizerin flammé** était en infériorité comparativement aux 3 dernières années.

Pour Matapédia : 11 observateurs ont consacré 33 heures dans ce secteur et identifié un total de 30 espèces pour 1,889 individus. Le **Busard Saint-Martin** et **Cardinal rouge** furent observés une première fois depuis 3 ans en cette période sur le territoire. Ce fut un plus haut taux noté pour le **Durbec des Sapins** et le **Gros-bec errant**. Le **Sizerin flammé** était en plus petit nombre pendant ce RON.

Christianne Pitre

NOM DE L'ESPÈCE 2004

Secteur

	Forillon	Percé	New Richmond	Matapédia	Total
Bernache du Canada (Canada Goose)	1077	2			1079
Canard noir (American Black Duck)	80	7	250		337
Canard colvert (Mallard)	3	1	6	3	13
Canard pilet (Northern Pintail)		1			1
Eider à duvet (Common Eider)	76	403			479
Arlequin plongeur (Harlequin Duck)		6			6
Macreuse à front blanc (Surf Scoter)	1	6	3		10
Macreuse sp (Scoter sp)	3				3
Harelde kakawi (Long-tailed Duck)	402	513	20		935
Garrot à oeil d'or (Common Goldeneye)	223	125	51		399
Garrot d'Islande (Barrow's Goldeneye)	78	111	21		210
Grand Harle (Common Merganser)		14	3		17
Harle huppé (Red-breasted Merganser)	206 US	91	33		330
Gélinotte huppée (Ruffed Grouse)	6			8	14
Plongeon huard (Common Loon)		3			3
Grèbe jougris (Red-necked Grebe)	2	1			3
Cormoran à aigrettes (Double-crested Cormorant)	11	1	4		16
Grand Cormoran (Great Cormorant)	169	42			211
Grand Héron (Great Blue Heron)	CW US				
Pygargue à tête blanche (Bald Eagle)		1		1	2
Busard Saint-Martin (Northern Harrier)				1 US	1
Épervier brun (Sharp-shinned Hawk)			1		1
Autour des palombes (Northern Goshawk)	1	1			2
Accipiter sp (accipiter sp)	1				1
Faucon gerfaut (Gyrfalcon)		1			1
Goéland à bec cerclé (Ring-billed Gull)			6		6
Goéland argenté (Herring Gull)	103	44	387		534
Goéland arctique (Iceland Gull)	5	2			7
Goéland bourgmestre (Glaucous Gull)	6	4	6		16
Goéland marin (Great Black-backed Gull)	49	46	454		549
Goéland sp. (Gull sp.)	6	1			7
Mouette tridactyle (Black-legged Kittiwake)		2			2
Mergule nain (Dovekie)		2			2
Petit Pingouin (Razorbill)	1 US				1 US
Guillemot à miroir (Black Guillemot)		26	5		31
Pigeon biset (Rock Dove)		30		88	118
Tourterelle triste (Mourning Dove)	16	44	1	6	67
Harfang des neiges (Snowy Owl)	CW				
Chouette rayée (Borred Owl)	1				1
Pic à ventre roux (Red-bellied Woodpecker)	1 US	2	1		4
Pic mineur (Downy Woodpecker)	11	3	2	8	24
Pic chevelu (Hairy Woodpecker)	2	7	2	16	27
Pic flamboyant (Northern Flicker)			1		1
Pic sp. (Woodpecker sp.)	2	1			3
Pie-grièche grise (Northern Shrike)		2		3	5
Mésangeai du Canada (Gray Jay)	2	1		20	23
Geai bleu (Blue Jay)	21	42	8	153	224
Corneille d'Amérique (American Crow)	37	95	317	92	541
Grand Corbeau (Common Raven)	20	99	29	30	178
Mésange à tête noire (Black-capped Chickadee)	152	124	57	231	564
Mésange à tête brune (Boreal Chickadee)	6	29	1	8	44
Mésange sp (Chickadee sp)	7				7
Sittelle à poitrine rousse (Red-breasted Nuthatch)	8	60	10	15	93
Grimpereau brun (Brown Creeper)				2	2
Roitelet à couronne dorée (Golden crowned Kinglet)	1	2	2		5
Merle d'Amérique (American Robin)	5	27		1 US	33
Étourneau sansonnet (European Starling)	21	182	62	72	337
Jaseur boréal (Bohemian Waxwing)	35	348		1	384
Jaseur d'Amérique (Cedar Waxwing)		105	53		158
Bruant hudsonien (American Tree Sparrow)	10	3			13
Bruant à gorge blanche (White-troated Sparrow)	1	1			2
Junco ardoisé (Dark-eyed Junco)		8	4	11	23
Plectrophane des neiges (Snow Bunting)	3	97		364	464
Cardinal rouge (Northern Cardinal)		1		1	2
Carouge à épaulettes (Red-winged Blackbird)	1	1			2
Quiscale rouilleux (Rusty Blackbird)		1			1
Quiscale bronzé (Common Grackle)		2			2
Durbec des sapins (Pine Grosbeak)	10	162	10	113	295
Bec-croisé bifascié (White-winged Crossbill)	6	57		1	64
Sizerin flammé (Common Redpoll)	6	6	18	52	82
Tarin des pins (Pine Siskin)	4	15		44	63
Chardonneret jaune (American Goldfinch)	6	96	26	121	249
Gros-bec errant (Evening Grosbeak)	21	51	25	370	467
Moineau domestique (House Sparrow)		2	3	53	58
Total des espèces (jour du recensement)	45	59	35	30	69
Total des espèces (semaine du recensement)	2	0	0	0	2
Total d'individus sp. (jour du recensement)	19	2	0	0	21
Total d'individus	2 925	3 163	1 802	1 889	9 859
NOMBRE D'OBSERVATEURS	18	11	5	11	45

cw (count week) signifie que l'espèce a été observée dans la semaine du recensement (3 jours avant ou 3 jours après).